



Information für den Anwender/ Gebrauchsinformation



SNIVEX®

Dosierspray ohne Konservierungsstoffe zum Einsprühen in die Nase

Wirkstoff: Xylometazolinhydrochlorid

1 Spühstoß zu 0,09 ml enthält 0,09 mg Xylometazolinhydrochlorid

Inhaltsstoffe: gereinigtes Wasser, Dexpanthenol, Natriumhyaluronat, Glycerol 85 %, Natriumcitrat, Citronensäuremonohydrat (Puffersubstanzen)

Indikation:

SNIVEX® ist ein Nasenspray zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen und zur unterstützenden Behandlung der Heilung von Haut- und Schleimhautschädigungen. Eine laufende Nase ist ein typisches Symptom einer beginnenden Erkältung. Häufiges Niesen und das Laufen der Nase sollen die Krankheitserreger aus der Nase hinausbefördern. Hat sich die Infektion einmal festgesetzt, entzündet sich die Schleimhaut, mit der die Nasenhöhlen ausgekleidet sind. Dies äußert sich in einer Schwellung, die zur verstopften Nase führt. Die Nase füllt sich mit Schleim. Durch das Ab- und Anschwellen der Schleimhäute und das häufige Schnäuzen wird die empfindliche Nasenschleimhaut stark beansprucht und trocknet daher schnell aus.

SNIVEX® befreit nicht nur rasch die Nase, sondern schützt auch gleichzeitig die empfindlichen Schleimhäute. Denn nur SNIVEX® enthält neben einem abschwellenden Wirkstoff das für seine Wundheilung bekannte Provitamin Dexpanthenol in einer Dosierung von 5 %. Zusätzlich enthält es Natriumhyaluronat, das als Feuchthalter die Schleimhaut schont und regeneriert. Diese in SNIVEX® enthaltenen Substanzen pflegen und schützen die Schleimhäute zusätzlich.

Kontraindikation:

Bei allen Arzneimitteln können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten, in diesem Fall müssen Sie das Medikament sofort absetzen. Wenn schon eine Allergie gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels bekannt ist, darf es nicht angewendet werden.

Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei:

- trockener Entzündung der Nasenschleimhaut
- Kleinkindern unter 6 Jahren

Das Arzneimittel darf nur nach ärztlichem Rat angewendet werden bei:

- Einnahme von blutdrucksteigernden Arzneimitteln (z. B. MAO-Hemmern)
- erhöhtem Augeninnendruck (z. B. Engwinkelglaukom)
- schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. Bluthochdruck und Erkrankungen der Herzkranzgefäße)
- Phäochromozytom (seltener Nierentumor)
- Stoffwechselstörungen (z. B. Schilddrüsenüberfunktion, Diabetes)

Dosierung:

Soweit nicht anders verordnet, wird von SNIVEX® bei Erwachsenen und Schulkindern nach Bedarf bis zu 3-mal täglich je ein Sprühstoß in jede Nasenöffnung eingebracht. SNIVEX® sollte nicht länger als 7 Tage angewendet werden.





SNIVEX®

Dosierspray ohne Konservierungsstoffe zum Einsprühen in die Nase

Nebenwirkungen:

Nebenwirkungen können bei jedem Arzneimittel auftreten. Sie sind meist harmlos und nur vorübergehender Natur.

Es können auftreten:

Herzklopfen, Pulsbeschleunigung, Blutdruckanstieg, Schlaflosigkeit, Müdigkeit.

In einzelnen Fällen kann es nach Abklingen der abschwellenden Wirkung wieder zu einer verstärkten Schleimhautschwellung in der Nase kommen.

Bei empfindlichen Personen können vorübergehend leichte Reizerscheinungen der Nasenschleimhaut (Brennen oder Trockenheit) hervorgerufen werden.

Bei längerem oder übermäßigem Gebrauch von Xylometazolin (dem Wirkstoff von SNIVEX®) kann es zu einem eingeschränkten Reaktionsvermögen und zu Herz-Kreislauf-Störungen kommen. In diesen Fällen kann die Fähigkeit zum Führen eines Kraftfahrzeugs und zur Bedienung von Maschinen beeinträchtigt sein.


Schwangerschaft:

Während Schwangerschaft und Stillzeit sollten Sie Medikamente möglichst nur nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker einnehmen! Das Medikament soll in der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht angewendet werden, da die Wirkung von Xylometazolin während Schwangerschaft und Stillzeit in Hinblick auf das Kind noch nicht hinreichend erforscht ist.

Anwendung:

Die Schutzkappe von dem Sprühkopf abziehen. Vor der ersten Anwendung mehrmals pumpen, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel austritt. Den Sprühkopf in die Nasenöffnung einführen und jeweils 1 x pumpen. Dabei leicht durch die Nase atmen.

Nach Gebrauch bitte die Schutzkappe wieder aufsetzen.



Patientenhinweise:

Das Arzneimittel soll nicht länger als 7 Tage angewendet werden. Zur Anwendungsdauer bei Kindern sollte grundsätzlich der Arzt befragt werden. Bei längerer Applikation oder höherer Dosierung von SNIVEX® sind Wirkungen auf Herz- und Kreislauffunktionen oder das Nervensystem nicht auszuschließen. In diesen Fällen kann die Fähigkeit zum Führen eines Kraftfahrzeugs und zur Bedienung von Maschinen beeinträchtigt sein. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Zulassungsnummer: 2459.98.99 (Standardzulassung)

Apothekenpflichtig

Hersteller: Burg-Apotheke · Frankfurter Straße 7 · D-61462 Königstein im Taunus
Tel.: +49 6174 9929-500 · Fax: +49 6174 9929-699 · info@apotheke-koenigstein.de

