

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient !

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Bezeichnung des Arzneimittels:

Onymyken 100

Wirkstoff: Clotrimazol

Indikationsgruppe:

Arzneimittel bei Pilzinfektion (Lokalantimykotikum)

Anwendungsgebiete:

Pilzinfektionen der Haut durch Dermatophyten, Hefen und Schimmelpilze. Diese können vorkommen z.B. in Form von: Mykosen der Füße (Fußpilz), Mykosen der Haut und Hautfalten, oberflächlichen Candidosen.

Gegenanzeigen:

Absolut: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Clotrimazol

Was muss in Schwangerschaft und Stillzeit beachtet werden ?

Schwangerschaft:

Sie können Onymyken 100 bei bestimmungsgemäßem Gebrauch während der Schwangerschaft anwenden.

Stillzeit:

Sie können Onymyken 100 bei bestimmungsgemäßem Gebrauch während der Stillzeit anwenden. Um den direkten Kontakt Ihres Säuglings mit Onymyken 100 zu vermeiden, sollten Sie Onymyken 100 während der gesamten Stillzeit nicht im Brustbereich anwenden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen ?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Was müssen Sie sonst noch beachten ?

Keine Anwendung auf Schleimhäuten und keine vaginale Anwendung.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie vor der Anwendung von Onymyken 100 beachten ?

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Onymyken 100 ist erforderlich in Schwangerschaft und Stillzeit. Sie können Onymyken 100 bei bestimmungsgemäßem Gebrauch während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden. Um den direkten Kontakt Ihres Säuglings mit Onymyken 100 zu vermeiden, sollten Sie Onymyken 100 während der gesamten Stillzeit nicht im Brustbereich anwenden.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Onymyken 100: Propylenglykol kann Hautreizungen hervorrufen.

Hinweis: Ungeeignet zur Behandlung der Trichomoniasis.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Clotrimazol vermindert die Wirksamkeit von Amphotericin und anderen Polyenantibiotika (Nystatin, Natamycin).

Dosierungsanleitung mit Art und Dauer der Anwendung:

Wie sollten Sie Onymyken 100 dosieren und anwenden ?

Soweit nicht anders verordnet: Die betroffenen Stellen 2 - 3 mal täglich einpinseln.

Wie lange sollten Sie Onymyken 100 anwenden ?

Wichtig für den Behandlungserfolg ist eine regelmäßige und ausreichend lange Anwendung. Die Dauer der Behandlung ist abhängig von der Art, dem Ausmaß und der Stelle der Erkrankung. Um eine vollständige Ausheilung zu erreichen, sollte die Behandlung nicht gleich nach dem Abklingen der subjektiven Beschwerden beendet werden, sondern bis zu einer Behandlungsdauer von mindestens 4 Wochen fortgesetzt werden. Bei Fußpilz sollte zur Vermeidung von Rückfällen trotz rascher subjektiver Besserung ca. 2 Wochen über das Verschwinden der Krankheitszeichen hinaus behandelt werden.

Hinweise für den Fall der Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn Onymyken 100 in zu großen Mengen angewendet wurde (Überdosierung) ?

Berichte über Vergiftungsfälle mit Clotrimazol liegen nicht vor. Es existiert kein spezielles Gegenmittel.

Nebenwirkungen:

Hautreaktionen (z.B. vorübergehende Rötung, Brennen, Stechen) kommen nur gelegentlich vor. Bei sehr seltener Überempfindlichkeit gegen Propylenglykol und Macrogol (Polyethylenglykol) sind allergische Reaktionen der Haut möglich.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Heilpraktiker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Onymyken 100 soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Das Verfalldatum finden Sie auf dem Flaschenetikett und dem Umkarton.

Onymyken 100 ist nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Nicht über 25°C lagern.

Zusammensetzung:

1 ml Lösung enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

10 mg Clotrimazol

Sonstige Bestandteile: 2-Propanol (Ph. Eur.), Macrogol 400, Propylenglykol

Darreichungsform, Inhalt nach Rauminhalt:

Lösung

20 ml bzw. 50 ml bzw. 100 ml Originalpackungen

Musterpackung mit 20 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Schuck GmbH, Industriestrasse 11, 90571 Schwaig b Nürnberg

Datum der Fassung der Packungsbeilage:

Juni 2015