

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen Abaloparatid

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Ende Abschnitt 4.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Eladynos und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Eladynos beachten?
3. Wie ist Eladynos anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Eladynos aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Eladynos und wofür wird es angewendet?

Eladynos enthält den Wirkstoff Abaloparatid. Es wird bei Frauen nach der Menopause angewendet zur Behandlung der Osteoporose.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Osteoporose tritt besonders häufig bei Frauen nach der Menopause auf. Die Krankheit führt dazu, dass die Knochen spröde und zerbrechlich werden. Wer an Osteoporose leidet, hat ein höheres Risiko für Knochenbrüche, insbesondere in der Wirbelsäule, den Hüften und den Handgelenken.

Dieses Arzneimittel wird angewendet, um die Knochen zu stärken und das Risiko von Knochenbrüchen zu senken.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Eladynos beachten?

Eladynos darf nicht angewendet werden, wenn Sie

- allergisch gegen Abaloparatid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind
- schwanger sind oder stillen
- nach wie vor schwanger werden können
- hohe Calciumwerte im Blut haben
- eine schwerwiegend eingeschränkte Nierenfunktion haben
- unerklärlich hohe Blutwerte des Enzyms alkalische Phosphatase haben
- eine Strahlentherapie für Ihre Knochen hatten
- jemals Knochenkrebs oder andere Krebsarten hatten, die sich auf Ihre Knochen ausgebreitet haben

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor oder während Sie Eladynos anwenden:

- wenn Ihnen beim Aufstehen schwindelig wird, was auf einen Blutdruckabfall zurückzuführen sein kann. Bei einigen Patientinnen kann es innerhalb von 4 Stunden nach der Eladynos-Injektion zu Schwindelgefühlen oder schnellem Herzschlag kommen. Die erste(n) Injektion(en) sollte(n) unter Anleitung einer medizinischen Fachkraft durchgeführt werden, die Sie in der ersten Stunde nach der Injektion beobachten kann. Injizieren Sie Eladynos immer an einem Ort, an dem Sie sich sofort setzen oder hinlegen können, wenn Ihnen schwindelig wird.
- wenn Sie eine Herzkrankheit oder hohen Blutdruck haben. Ihr Arzt wird Sie möglicherweise genauer überwachen wollen.
- wenn Sie anhaltende Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Energiemangel oder Muskelschwäche haben. Dies können Anzeichen für zu viel Calcium in Ihrem Blut sein.
- wenn Sie einen hohen Calciumgehalt im Urin haben, Nierensteine haben oder hatten. Eladynos könnte Ihre Beschwerden verschlimmern. Bevor Sie mit der Behandlung mit Eladynos beginnen, wird Ihr Blutdruck und der Zustand Ihres Herzes untersucht. Die empfohlene Behandlungsdauer von 18 Monaten darf nicht überschritten werden.

Kinder und Jugendliche

Eladynos darf bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Anwendung von Eladynos zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Informieren Sie insbesondere Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie folgende Arzneimittel einnehmen:

- Digoxin oder Digitalis: Arzneimittel zur Behandlung von Herzschwäche, da der Calciumspiegel in Ihrem Blut bei der Anwendung von Abaloparatid ansteigen kann

- Arzneimittel zur Behandlung von Bluthochdruck, da diese die Symptome eines niedrigen Blutdrucks, einschließlich Schwindel, verschlimmern können

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Schwangerschaft und Stillzeit

Eladynos darf nicht angewendet werden, wenn Sie schwanger sind oder schwanger werden können, oder wenn Sie stillen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Einige Patientinnen können sich nach der Injektion dieses Arzneimittels schwindelig fühlen. Wenn Ihnen schwindelig ist, fahren Sie nicht Auto und bedienen Sie keine Maschinen, bis Sie sich besser fühlen.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos enthält Natrium

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 Milligramm) pro Dosis, d. h. es ist nahezu „natriumfrei“.

3. Wie ist Eladynos anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Die empfohlene Dosis beträgt **eine Injektion** (80 Mikrogramm) **einmal täglich** unter die Haut im Unterbauch. Siehe den grau schattierten Bereich der ersten Abbildung in Schritt 5 unter „Hinweise für den Gebrauch“ am Ende der Packungsbeilage.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Injizieren Sie Eladynos vorzugsweise jeden Tag zur gleichen Zeit, damit Sie sich besser an die Anwendung Ihres Arzneimittels erinnern können.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Injizieren Sie Eladynos nicht an derselben Stelle am Bauch wie am Vortag. Wechseln Sie jeden Tag die Injektionsstelle, um das Risiko von Reaktionen an der Injektionsstelle zu verringern. Injizieren Sie nur in gesunde Haut. Injizieren Sie nicht in Bereiche, in denen die Haut empfindlich, verletzt, gerötet, schuppig oder verhärtet ist. Vermeiden Sie Bereiche mit Narben oder Dehnungsstreifen.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Bitte befolgen Sie sorgfältig die **„Hinweise für den Gebrauch“** am Ende der Packungsbeilage.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Ihr Arzt kann Ihnen raten, zusätzliches Calcium und Vitamin D einzunehmen. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie viel Sie täglich einnehmen sollten.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Dauer der Anwendung

Injizieren Sie Eladynos täglich so lange, wie Ihr Arzt es Ihnen verschrieben hat. Die maximale Gesamtdauer der Behandlung mit Eladynos darf 18 Monate nicht überschreiten.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Wenn Sie eine größere Menge von Eladynos angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich mehr Eladynos anwenden, als Sie sollten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Zu den zu erwartenden Wirkungen einer Überdosierung gehören Übelkeit, Erbrechen, Schwindel (insbesondere beim schnellen Aufstehen), schneller Herzschlag und Kopfschmerzen.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Wenn Sie die Anwendung von Eladynos vergessen haben

Wenn Sie eine Dosis vergessen haben, injizieren Sie sie so bald wie möglich innerhalb von 12 Stunden nach dem normalen Zeitpunkt. Injizieren Sie dann Ihre nächste Dosis zur üblichen Zeit am nächsten Tag.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Wenn mehr als 12 Stunden vergangen sind, seit Sie Eladynos hätten anwenden sollen, lassen Sie die vergessene Dosis aus. Injizieren Sie dann die nächste Dosis wie gewohnt am nächsten Tag.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Injizieren Sie das Arzneimittel nicht mehr als einmal an demselben Tag.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Wenn Sie die Anwendung von Eladynos abbrechen

Besprechen Sie dies mit Ihrem Arzt, bevor Sie die Behandlung abbrechen. Ihr Arzt wird Sie beraten und entscheiden, wie lange Sie mit Eladynos behandelt werden sollten.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Brechen Sie die Einnahme von Eladynos ab und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt oder suchen Sie die Notaufnahme auf, wenn bei Ihnen folgende Symptome auftreten (schwere allergische Reaktion): Schwellungen des Gesichts oder der Zunge, Keuchen und Atembeschwerden, Nesselsucht, Juckreiz und Hautrötung, schweres Erbrechen und Durchfall, Benommenheit oder Bewusstlosigkeit (Häufigkeit nicht bekannt). Diese Symptome können schwerwiegend und potenziell lebensbedrohlich sein.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Andere Nebenwirkungen können in den folgenden Häufigkeiten auftreten:

Sehr häufig (kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen)

- Erhöhung des Calciumspiegels, nachgewiesen in Urintests
- Schwindel – siehe Abschnitt 2 „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)

- Erhöhung des Calciumspiegels, nachgewiesen in Bluttests
- Erhöhung des Harnsäurespiegels, nachgewiesen in Bluttests

- Kopfschmerz
- Palpitationen (Herzklopfen), erhöhte Herzfrequenz
- erhöhter Blutdruck
- Bauchschmerzen
- Verstopfung, Durchfall
- Übelkeit, Erbrechen
- Schwäche, Müdigkeit, Unwohlsein
- Reaktionen an der Injektionsstelle wie Blutergüsse, Hautausschlag und Schmerzen
- Schmerzen in Knochen, Gelenken, Händen, Füßen oder Rücken
- Muskelkrämpfe (Rücken und Beine)
- Schlafstörungen
- Nierensteine
- Juckreiz, Hautausschlag

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen)

- allergische Reaktionen
- Völlegefühl
- Schmerzen
- Schwindelgefühl oder Benommenheit beim Aufstehen oder Aufsetzen aufgrund eines Blutdruckabfalls

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

D-53175 Bonn

Website: www.bfarm.de

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

5. Wie ist Eladynos aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Pen nach „verwendbar bis“ bzw.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

„verw.bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Vor der ersten Anwendung im Kühlschrank lagern (2 °C-8 °C). Nicht einfrieren. Stellen Sie die Pens nicht in die Nähe des Eisfachs des Kühlschranks, um ein Einfrieren zu verhindern. Eladynos darf nicht angewendet werden, wenn es eingefroren ist oder war.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Nach der ersten Anwendung unter 25 °C aufbewahren und nach 30 Tagen entsorgen. Eladynos darf bei Raumtemperatur (unter 25 °C) nur bis zu 30 Tage lang aufbewahrt werden.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

- Notieren Sie das Datum des 1. Tages der Verwendung in der auf dem Umkarton vorgesehenen Fläche. Tag 1 ist das Datum der ersten Anwendung oder das Datum, an dem der Pen aus dem Kühlschrank genommen wurde. Damit soll sichergestellt werden, dass Sie den Pen nicht länger als 30 Tage hintereinander verwenden oder ihn länger als 30 Tage aufbewahren. Entsorgen Sie den Pen nach 30 Tagen entsprechend den örtlichen Vorschriften, auch wenn er noch unbenutztes Arzneimittel enthält.
- Entsorgen Sie Ihren alten Pen, bevor Sie einen neuen Eladynos-Pen herausholen, um mögliche Verwechslungen zu vermeiden.
- Den Pen nicht mit eingesetzter Nadel aufbewahren.
- Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht verwenden, wenn die Lösung trüb oder gefärbt ist oder Partikel enthält.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Entsorgen Sie Arzneimittel oder Nadeln nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen Was Eladynos enthält

- Der Wirkstoff ist: Abaloparatid. Jede Dosis von 40 Mikrolitern enthält 80 Mikrogramm Abaloparatid. Jeder Fertipgen enthält 3 mg Abaloparatid in 1,5 ml Lösung (entsprechend 2 Milligramm pro ml).
- Die sonstigen Bestandteile sind:
 - Phenol
 - Wasser für Injektionszwecke
 - Natriumacetat-Trihydrat (siehe Abschnitt 2 „Eladynos enthält Natrium“) und Essigsäure 99 % (beide zur pH-Werteinstellung)

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Wie Eladynos aussieht und Inhalt der Packung

Eladynos ist eine farblose und klare Injektionslösung (Injektion). Es wird bereitgestellt in einem Umkarton mit einem oder drei Mehrdosen-Fertipgens mit jeweils 30 Dosen.

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Zulassungsinhaber:

Theramex Ireland Limited

3rd Floor, Kilmore House,

Park Lane, Spencer Dock,

Dublin 1

D01 YE64

Irland

Hersteller:

Theramex Poland Sp. z o. o.

Amsterdam Building,

ul. Poleczki 35,

02-822 Warszawa

Polen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Parallel vertrieben von:

Orifarm GmbH

Fixheider Str. 4

51381 Leverkusen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Umgepackt von:

Orifarm Supply s.r.o.

Palouky 1366

253 01 Hostivice

Tschechien

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen


Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen


Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fertipgen

Eladynos 80 Mikrogramm/Dosis Injektionslösung im Fert



Ziehen Sie die **innere Nadelschutzkappe** vorsichtig ab und entsorgen Sie sie.



Schritt 3 Nur Tag 1 – Test eines Eladynos-Pens vor der ersten Injektion


In Ihrem Pen befindet sich eine Arzneimittelmenge für 30 Tage sowie eine kleine Menge, die reicht, um jeden Pen einmal testen zu können, um seine Funktionstüchtigkeit zu bestätigen.

Achtung: Wenn Sie den Pen vor jeder Injektion testen, wird die Arzneimittelmenge in Ihrem Pen vorzeitig verbraucht sein. **Führen Sie daher Schritt 3 nur an Tag 1**, vor der ersten Injektion mit jedem Pen, durch.

Testen Sie den Pen an Tag 2 bis Tag 30 nicht erneut, sondern gehen Sie direkt zu Schritt 4, um die Dosis für Ihre Injektion festzulegen.

Halten Sie den Pen wie abgebildet und drehen Sie das Dosierradchen an Ihrem Pen bis zum Anschlag von sich weg.


Im Dosisfenster **sehen Sie „•80“**.



Halten Sie den Pen so, dass die Nadel nach oben zeigt.


Drücken Sie den grünen Injektionsknopf, bis er nicht mehr weitergeht.

Aus der Nadelspitze sollte Flüssigkeit in Form eines Tropfens oder Strahls austreten.




Im Dosisfenster sollten Sie **„•0“** sehen.

Hinweis: Wenn keine Flüssigkeit aus der Nadelspitze austritt, siehe unter „Problembhebung“.



Schritt 4 Einstellen der Dosis auf Ihrem Eladynos-Pen

Drehen Sie den weißen Knopf an Ihrem Pen von sich weg, bis der Knopf anhält und **„•80“ im Dosisfenster steht**. Ihr Pen ist nun bereit für die Injektion.



Hinweis: Wenn Sie den Pen nicht auf „•80“ einstellen können, siehe unten unter „Problembhebung“.

Schritt 5 Auswahl und Reinigung der Injektionsstelle

Die Injektion sollte in den Unterbauch erfolgen, wie in der grau dargestellten Fläche zu sehen ist. Vermeiden Sie den direkten Bereich um Ihren Bauchnabel von ca. 5 cm Breite.



Wählen Sie jeden Tag eine andere Injektionsstelle am Bauch. Injizieren Sie nur in gesunde Haut. Injizieren Sie nicht in Bereiche, in denen die Haut empfindlich, verletzt, gerötet, schuppig oder verhärtet ist. Vermeiden Sie Bereiche mit Narben oder Dehnungsstreifen.

Wischen Sie die Injektionsstelle mit einem Alkoholtupfer ab und lassen Sie sie trocknen.

Berühren Sie die Injektionsstelle nach der Reinigung nicht, fächeln oder blasen Sie nicht darauf.




Hinweis: Ihr Arzt, das medizinische Fachpersonal oder Ihr Apotheker kann Ihnen empfehlen, die Haut an der Injektionsstelle zusammenzukneifen.

Sobald die Nadel in die Haut eindringt, kann die Haut losgelassen werden.

Schritt 6 Verabreichung Ihrer Injektion mit dem Eladynos-Pen


Führen Sie die Nadel gerade in die Haut ein.



Drücken Sie den grünen Knopf und HALTEN Sie ihn gedrückt, bis ALLE folgenden Ereignisse abgeschlossen sind

- „•0“ wird angezeigt
- halten Sie ihn für 10 Sekunden, damit die volle Dosis injiziert wird
- ziehen Sie den Pen aus der Haut und DANN lassen Sie den Knopf los.

Drücken Sie den grünen Knopf nur, wenn eine Nadel eingesetzt ist.




Hinweis: Bewegen Sie den Pen nach dem Einführen nicht. Wenn sich der grüne Injektionsknopf nicht nach unten drücken lässt oder vor „•0“ stehen bleibt, siehe unten unter „Problembhebung“.

Ziehen Sie den Pen langsam aus der Injektionsstelle, indem Sie die Pen-Nadel gerade herausziehen.

Es kann eine leichte Blutung auftreten; das ist normal. Reiben Sie die Injektionsstelle nicht. Falls eine leichte Blutung auftritt, drücken Sie bei Bedarf einen Wattebausch oder einen Mulltupfer auf die Injektionsstelle. Sie können die Stelle auch mit einem kleinen Pflaster abdecken.

Schritt 7 Die Pen-Nadel entnehmen

Achtung: Um Nadelstichverletzungen zu vermeiden, befolgen Sie diesen Schritt sorgfältig. Setzen Sie die **äußere Nadelschutzkappe vorsichtig wieder auf die Nadel**. Drücken Sie dann vorsichtig auf die äußere Nadelschutzkappe, bis sie einrastet und fest sitzt.




Schrauben Sie die mit Nadelschutzkappe gesicherte Nadel ab. Um die mit Nadelschutzkappe gesicherte Nadel abzuschrauben, drücken Sie die Schutzkappe am unteren Teil gegen die Nadel und drehen Sie sie dann mindestens 8 Mal, bevor Sie vorsichtig daran ziehen, bis sich die Nadel löst.

Hinweis: Drücken Sie die äußere Nadelschutzkappe nicht nach unten, während Sie die Nadel abschrauben.




Hinweis: Es sollte zu sehen sein, dass sich der Spalt zwischen der äußeren Nadelschutzkappe und dem Pen vergrößert, während Sie die Nadel abschrauben.



Schritt 8 Nach Ihrer Injektion

Setzen Sie die Pen-Schutzkappe wieder fest auf den Eladynos Pen. Lassen Sie die Schutzkappe zwischen den Injektionen auf Ihrem Pen.



Problembhebung

Was soll ich tun, wenn die Nadel verbogen ist?

- Entfernen Sie vorsichtig die verbogene Nadel und folgen Sie Schritt 2, um eine neue Nadel in den Pen einzusetzen. Die Pen-Nadel hat einen sichtbaren Teil, der in die Haut eindringt, und einen versteckten inneren Nadelteil, der in die Dichtscheibe des Pens eindringt.
- Überprüfen Sie die Teile der Pen-Nadel und achten Sie dabei besonders auf den inneren Teil der Nadel. Der sichtbare Teil der Nadel sieht zwar gerade aus, aber die innere Nadel kann sich beim Anbringen der Nadel am Pen verbiegen.
- Achten Sie darauf, die gesamte Pen-Nadel gerade zu halten, wenn Sie sie am Pen anbringen, um ein Verbiegen der inneren Nadel zu vermeiden.

Was soll ich tun, wenn beim Testen des Pens an Tag 1 keine Flüssigkeit aus der Nadelspitze austritt?

- Wenn Sie keine Flüssigkeit aus der Nadel austreten sehen, ist die Einrichtung des Pens noch nicht abgeschlossen. Die Nadel kann verstopft, verbogen oder nicht richtig eingesetzt sein.
- Folgen Sie Schritt 2, um eine neue Nadel in den Pen einzusetzen, und wiederholen Sie Schritt 3 „Test eines Eladynos-Pens vor der ersten Injektion“.
- Wenn Sie immer noch keinen Tropfen Flüssigkeit sehen, wenden Sie sich an Ihren Apotheker, das medizinische Fachpersonal oder Ihren Arzt.

Was soll ich tun, wenn ich das weiße Dosierradchen nicht drehen kann, um den Eladynos-Pen auf „•80“ einzustellen?

- Der Pen enthält nicht genug Arzneimittel, um eine volle Dosis verabreichen zu können. Sie müssen sich einen neuen Pen besorgen.

Was soll ich tun, wenn der grüne Injektionsknopf schwer zu drücken ist?

- Wenn sich der grüne Injektionsknopf nicht nach unten drücken lässt oder stoppt, bevor „•0“ im Dosisfenster erscheint, ist der Test des neuen Pens nicht abgeschlossen. Die Nadel kann verstopft oder nicht richtig eingesetzt sein.
- Folgen Sie Schritt 2, um eine neue Nadel in den Pen einzusetzen.
- Wenn sich der grüne Injektionsknopf immer noch nicht nach unten drücken lässt oder stoppt, bevor „•0“ im Dosisfenster erscheint, wenden Sie sich an Ihren Apotheker, das medizinische Fachpersonal oder Ihren Arzt.